



خود کفیل تحریک
SELF SUFFICIENT MOVEMENT

پودوں کی حفاظت اور کھاد کا چارٹ

بیماری پہچانیں • دیسی علاج • صحیح دوا • صحیح مقدار میں کھاد

Plant Protection & Fertilizer Chart for AJK

پتہ مروڑ ہو، پتے پیلے اور کمزور ہوں یا پھل گر رہا ہو، یہ چارٹ بتاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، پہلے کون سا دیسی اور سستا علاج آزمائیں، ضرورت ہو تو کون سی دوا کتنی مقدار میں ڈالیں، اور ہر فصل اور درخت کو کتنی کھاد چاہیے۔

1 تین آسان قدم Three simple steps

 ضرورت ہو تو دوا صحیح مقدار، صحیح وقت، پوری احتیاط کے ساتھ Medicine only if needed, at the right dose	 پہلے دیسی علاج سستا، محفوظ، اور مفید کیڑوں کو نقصان نہیں Try natural remedies first (page 10)	 پہچانیں پتہ اور پھل غور سے دیکھیں، صفحہ 2 سے مسئلہ ڈھونڈیں Identify the problem (page 2)
---	--	---

2 ناپ تول آسان بنائیں Easy measuring

1 bag = 50 kg کھاد کی ایک بوری	1 tsp ≈ 3-4 g ایک چائے کا چمچ پاؤڈر	1 tsp ≈ 5 ml ایک چائے کا چمچ مائع	16 L عام کمر والی اسپرے ٹینکی
-----------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------

تھوڑی مقدار (1 ملی لیٹر سے کم) کے لیے بغیر سوئی کی سرخ خریدیں، یہ سب سے صحیح ناپ دیتی ہے۔ ایک ایکڑ = 8 کنال = 160 مرلے۔

3 اپنا صفحہ کھولیں Contents

6-3 بیماریاں اور کیڑے Diseases & pests	2 پتہ دیکھ کر پہچانیں Find the problem
8 سبزیوں اور فصلوں کی کھاد Fertilizer: crops	7 پیلے اور کمزور پتے Weak & yellow leaves
10 دیسی نسخے اور احتیاط Home remedies & safety	9 پھلدار درختوں کی کھاد Fertilizer: fruit trees

⚠ ضروری: چارٹ میں دواؤں کے نام ان کے اجزاء سے لکھے ہیں، کمپنی کے نام سے نہیں۔ بازار میں ایک ہی دوا مختلف طاقت میں ملتی ہے، اس لیے بوتل یا پیکٹ کے لیبل پر لکھی مقدار ہی مانیں۔ سپرے کے بعد سبزی کم از کم 7 دن اور پھل 14 دن تک نہ توڑیں، یا جتنے دن لیبل پر لکھے ہوں۔

Find the problem

Khud Kafeel Tehreek · Plant Care Chart

پتہ دیکھ کر پہچانیں
جو نشانی نظر آئے، اس کا صفحہ کھولیں



صفحہ 3	آڑو کے نتے پتے سرخ، موٹے اور بھولے ہوتے آڑو کا پتہ مروڑ	
صفحہ 3	پتے مڑ کر چھوٹے اور کھردرے ٹماٹر، مرچ، پتہ مروڑ وائرس	
صفحہ 3	نیچے کے پتوں پر بھورے دائرے والے دھبے اگیتا جھلساؤ	
صفحہ 4	پانی کے باوجود پودا مر جھانے مر جھاؤ / جڑ گلن	
صفحہ 4	پتے بالائیں تو سفید مکھیاں اڑیں سفید مکھی	
صفحہ 4	کوئلوں پر چھوٹے سبز یا کالے کیڑے تیلا	
صفحہ 5	پھل اندر سے گلا ہوا، سنڈیاں پھل کی مکھی	
صفحہ 5	پتے کھائے ہوئے، پھل میں سوراخ سنڈی	
صفحہ 5	پتوں پر باریک جالا اور پیلے نقطے مکڑی جوئیں	
صفحہ 6	گندم کے پتوں پر پیلا پاؤڈر زرد گلی	
صفحہ 6	لیموں بالٹا پر ابھرے بھورے دھبے ترشاوہ لینکر	
صفحہ 6	تنے پر مٹی کی سرنگیں، پودا سوکھے دیمک	
صفحہ 6	اخروٹ پر کالے دھبے، گرمی کالی اخروٹ کے دھبے	
صفحہ 7	پتے پیلے یا کمزور، کوئی کیڑا نہیں خوراک گی کی یا پانی	
صفحہ 7	ٹماٹر کا نچلا سرا کالا کیٹشیم کی کمی	

یاد رکھیں: ہر پتہ بیماری نہیں ہوتا۔ زیادہ یا کم پانی، کور اور زیادہ کھاؤ بھی پتے خراب کرتے ہیں (صفحہ 7)۔ سمجھ نہ آئے تو تصویر کھینچ کر کسان ہیلپ ڈیسک پر بھیجیں، ماہرین مفت بتائیں گے: khudkafeeltehreek.com/ask-an-expert

ٹماٹر، مرچ، بھنڈی، کدو

پتہ مروڑ (وائرس)

Leaf curl virus

بیماریاں: پتے اوپر یا نیچے کی طرف مڑ کر چھوٹے، موٹے اور کھردرے ہو جائیں، پودا چھوٹا رہ جائے اور پھل کم لگے۔
وجہ: وائرس، جو سفید مکھی پھیلاتی ہے۔ وائرس کا علاج نہیں، سفید مکھی کو روکنا ہی بچاؤ ہے۔

ضرورت ہو تو دوا

دوا (اجزا)

امیڈاکلوپروڈ (سفید مکھی کے لیے)
Imidacloprid 200 SL

1 لیٹر میں 16 لیٹر ٹینکی
0.3 ملی لیٹر 5 ملی لیٹر

پہلے دیسی علاج

بیمار پودا شروع میں ہی جڑ سے اکھاڑ کر دبا دیں۔
پہلے چکنے والے کارڈ لگائیں۔
نیم کا تیل سپرے ہفتے میں ایک بار۔
پنیری جالی کے نیچے اگائیں

کب: سفید مکھی نظر آتے ہی؛ 10-12 دن بعد ضرورت ہو تو دوبارہ

آلو، خرباز، آلو بخارا

آلو کا پتہ مروڑ (پھپھوندی)

Peach leaf curl

بیماریاں: بہار میں نئے پتے موٹے، سرخی مائل اور پھولے ہوئے، جیسے چھالے ہوں؛ بعد میں جھڑ جاتے ہیں۔
وجہ: پھپھوندی، جو سردیوں میں شاخوں پر چھپی رہتی ہے۔ پتے نکلنے کے بعد سپرے فائدہ نہیں دیتا۔

ضرورت ہو تو دوا

دوا (اجزا)

کاپر آکسی کلورائیڈ
Copper oxychloride 50 WP

1 لیٹر میں 16 لیٹر ٹینکی
3 گرام 50 گرام

یا بورڈو مکسچر 1%
Bordeaux mixture 1%

نسخہ صفحہ 10 پر

پہلے دیسی علاج

بیمار پتے اور شاخیں کاٹ کر جلا دیں۔
گرے ہوئے پتے جمع کر کے تلف کریں

کب: پتے جھڑنے کے بعد (نومبر-دسمبر) اور کلیاں پھولنے سے پہلے (فروری)

کدو، کھیرا، مٹر، سیب، آم، گلاب

سفونی پھپھوندی (سفید پاؤڈر)

Powdery mildew

بیماریاں: پتوں پر سفید آٹے جیسا پاؤڈر، پتے پہلے ہو کر سوکھ جائیں۔
وجہ: پھپھوندی؛ خشک دن اور ٹھنڈی تم راتوں میں تیزی سے پھیلتی ہے۔

ضرورت ہو تو دوا

دوا (اجزا)

گندھک (سلفر)
Wettable sulphur 80 WP

1 لیٹر میں 16 لیٹر ٹینکی
2.5 گرام 40 گرام

یا ہیکسا کونازول
Hexaconazole 5 EC

1 ملی لیٹر 16 ملی لیٹر

پہلے دیسی علاج

کھٹی لٹی کا سپرے۔
میٹھے سوڈے کا سپرے۔
بیمار پتے توڑ دیں، پودوں میں ہوا کا راستہ رکھیں

کب: پہلے دھبے دیکھتے ہی؛ 10-15 دن بعد دوبارہ۔ 32° سے زیادہ گرمی میں گندھک نہ چھڑکیں

ٹماٹر، آلو، بینگن

اکیٹا جھلساؤ (بھورے دھبے)

Early blight

بیماریاں: نیچے کے پرانے پتوں پر بھورے دھبے، جن میں نشانہ جیسے دائرے ہوں؛ پتے پہلے ہو کر جھڑ جائیں۔
وجہ: پھپھوندی، جو مٹی سے نیچے کے پتوں پر چڑھتی ہے۔

ضرورت ہو تو دوا

دوا (اجزا)

مینکوزیب
Mancozeb 80 WP

1 لیٹر میں 16 لیٹر ٹینکی
2.5 گرام 40 گرام

یا ڈیفینوکونازول
Difenoconazole 250 EC

0.5 ملی لیٹر 8 ملی لیٹر

پہلے دیسی علاج

نیچے کے بیمار پتے توڑ دیں۔
پانی جڑ میں دیں، پتوں پر نہیں۔
پودے کے گرد ملچ (کھاس کی تہ) بچھائیں

کب: دھبے نظر آتے ہی؛ ہر 10 دن بعد، بارش کے موسم میں

پچھیتا جھلساؤ (کالا جھلساؤ)



Late blight



پہچان: پتوں پر پانی سے بھیگے کالے بڑے دھبے، نیچے سفید پھھوندی؛ چند دن میں پورا کھیت جل سا جاتا ہے۔
وجہ: پھھوندی؛ ٹھنڈا، بادل اور بارش والا موسم سب سے خطرناک۔

پہلے دیسی علاج

تصدیق شدہ صحت مندیج لگائیں۔ بیمار پودے فوراً نکال کر دبا دیں۔ مٹی چڑھائیں تاکہ آؤ ڈھکے رہیں

ضرورت ہو تو دوا

دوا (اجزا)

مینٹاکس + مینکوزیب

Metalaxyl + Mancozeb 72 WP

بچاؤ کے لیے مینکوزیب

Mancozeb 80 WP

1 لیٹر میں 16 لیٹر ٹینکی
2.5 گرام 40 گرام

2.5 گرام 40 گرام

نکب: ٹھنڈا بارشی موسم آتے ہی بچاؤ کا سپرے؛ بیماری ہو تو 7 دن بعد دوبارہ

مرجھاؤ اور جڑ گلن



Wilt & root rot



پہچان: پانی کے باوجود پودا اچانک مرجھا جائے، جڑ اور تنے کا پتلا حصہ بھورا یا گلا ہوا ہو۔
وجہ: مٹی کی پھھوندی؛ زیادہ پانی اور پانی کھڑا رہنے سے بڑھتی ہے۔

پہلے دیسی علاج

پانی کم اور نکاس اچھا رکھیں۔ ٹرائیکوڈرما والی کھاؤ ڈالیں۔ ہر سال جگہ بدل کر لگائیں

ضرورت ہو تو دوا

دوا (اجزا)

کاربندازیم (جڑوں میں ڈالیں)

Carbendazim 50 WP (drench)

1 لیٹر میں 16 لیٹر ٹینکی
1 گرام 16 گرام

نکب: آس پاس کے صحت مند پودوں کی جڑوں میں، آدھا گلاس فی پودا

تیلا (سست تیلا)



Aphids



پہچان: نئی کونپلوں اور پتوں کے نیچے چھوٹے سبز یا کالے کیڑے؛ پتے مڑ جائیں اور چپچپے ہو جائیں۔
وجہ: رس چوسنے والا کیڑا؛ بہار اور ٹھنڈے موسم میں زیادہ۔

پہلے دیسی علاج

صابن پانی یا نیم کاتیل سپرے۔ لہسن اور ہری مرچ کا سپرے۔ لیڈی برڈ (سرخ دھبوں والی بھونڈی) کو نہ ماریں، یہ تیلا کھاتی ہے

ضرورت ہو تو دوا

دوا (اجزا)

امیڈاکلوپریڈ

Imidacloprid 200 SL

1 لیٹر میں 16 لیٹر ٹینکی
0.3 ملی لیٹر 5 ملی لیٹر

نکب: جب کونپلوں پر تیلا جم جائے؛ ایک سپرے عام طور پر کافی ہے

سفید مکھی



Whitefly



پہچان: پتے ہلائیں تو چھوٹی سفید مکھیاں اڑیں؛ پتے پیلے اور چپچپے، اوپر کالی پھھوندی۔
وجہ: رس چوسنے والا کیڑا، جو پتہ مروڑ و انرس بھی پھیلاتا ہے؛ گرمیوں میں زیادہ۔

پہلے دیسی علاج

پیلے چکنے والے کارڈ (10-8 فی کنال)۔ نیم کاتیل یا صابن پانی، پتوں کے نیچے کی طرف۔ کھیت کے آس پاس جڑی بوٹیاں صاف رکھیں

ضرورت ہو تو دوا

دوا (اجزا)

امیڈاکلوپریڈ

Imidacloprid 200 SL

1 لیٹر میں 16 لیٹر ٹینکی
0.3 ملی لیٹر 5 ملی لیٹر

نکب: جب ہر پتے پر کئی مکھیاں ہوں؛ ایک ہی دوا بار بار نہ چھڑکیں

سنڈی (پھل اور تنے کا کیڑا)



Caterpillars & fruit borer

ٹماٹر، بینگن، گوبھی، مکئی، چنے

پہچان: پتے کھائے ہوئے، پھل میں سوراخ اور اندر سنڈی؛ بینگن کی کوپنل مر جھا جائے۔
وجہ: پروانے کی سنڈیاں؛ گرمی اور برسات میں زیادہ۔

ضرورت ہو تو دوا

دوا (اجزا)

اسپینوسایڈ

Spinosad

یا لیمبڈا سائٹیہیلو تھرین

Lambda-cyhalothrin 2.5 EC

1 لیٹر میں 16 لیٹر ٹینکی

0.3-0.5 ملی لیٹر 5-8 ملی لیٹر

1 ملی لیٹر 16 ملی لیٹر

پہلے دیسی علاج
سوراخ والے پھل اور مرجھائی کوئلیں توڑ کر زمین میں دبائیں۔ فیرومون
ٹریپ لگائیں (4-6 فی ایکڑ)۔ بی ٹی (حیاتیاتی دوا) 1-2 گرام فی لیٹر

کب: چھوٹی سنڈیاں دیکھتے ہی، شام کے وقت؛ پھول پر شہد کی مکھیاں ہوں تو نہیں

پھل کی مکھی



Fruit fly

امروہ، آم، آڑو، کدو، کھیرا، توری

پہچان: پھل پر چھوٹا سوراخ، اندر سے گلا ہوا اور سنڈیاں؛ پھل کچا ہی گر جائے۔
وجہ: مکھی پھل کے اندر انڈے دیتی ہے؛ گرے ہوئے پھل سے پھر پیدا ہوتی ہے۔

ضرورت ہو تو دوا

دوا (اجزا)

سپرے کی ضرورت کم؛ ٹریپ سب سے موثر

Traps work best (methyl eugenol / cue-lure)

1 لیٹر میں 16 لیٹر ٹینکی

— —

پہلے دیسی علاج
گرے اور خراب پھل روز اٹھا کر گہر ادبائیں۔ مکھی پکڑنے والے ٹریپ
(6-8 فی ایکڑ)۔ باغیچے میں پھل پر کاغذ کی پھلی چڑھائیں

کب: پھل بننا شروع ہوتے ہی ٹریپ لگادیں

مکڑی جونیں (مائیٹ)



Spider mites

بینگن، لوبیا، اسٹرابیری، سیب

پہچان: پتوں پر باریک پیلے نقطے، نیچے کی طرف باریک جالا؛ پتے کانسی جیسے ہو کر جھڑ جائیں۔
وجہ: بہت چھوٹے کیڑے؛ گرم خشک موسم اور گردیں تیزی سے بڑھتے ہیں۔

ضرورت ہو تو دوا

دوا (اجزا)

گندھک (سلفر)

Wettable sulphur 80 WP

یا ابا میکٹن

Abamectin 1.8 EC

1 لیٹر میں 16 لیٹر ٹینکی

2 گرام 32 گرام

0.5 ملی لیٹر 8 ملی لیٹر

پہلے دیسی علاج
پتوں کے نیچے پانی کی تیز دھار۔ نیم کا تیل سپرے۔ پودوں کو پیاسا نہ رکھیں

کب: جالا نظر آتے ہی؛ پتوں کے نیچے کی طرف اچھی طرح

سیب کی خارش (سکیب)



Apple scab

سیب، ناشپاتی

پہچان: پتوں اور پھلوں پر زیتونی سبز سے کالے کھردرے دھبے؛ پھل پھٹ جائے اور بد شکل ہو۔
وجہ: پھپھوندی، جو گرے پتوں میں سردی گزارتی ہے اور بہار کی بارش میں پھیلتی ہے۔

ضرورت ہو تو دوا

دوا (اجزا)

مینکوزیب

Mancozeb 80 WP

یا ڈیفینوکونازول

Difenoconazole 250 EC

1 لیٹر میں 16 لیٹر ٹینکی

2.5 گرام 40 گرام

0.3 ملی لیٹر 5 ملی لیٹر

پہلے دیسی علاج
سردیوں میں گرے پتے جمع کر کے جلائیں یا دبائیں۔ کانٹ چھانٹ کر کے
درخت میں ہوا اور دھوپ کا راستہ بنائیں

کب: کلیاں سبز ہوتے ہی، پھر بارشی موسم میں ہر 10-15 دن



لیموں، مالٹا، کینو

ترشاوہ لینکر

Citrus canker

بہچان: پتوں، شاخوں اور پھلوں پر ابھرے ہوئے کھررے بھورے دھبے، ارد گردیٹا بالہ۔
وجہ: جراثیم؛ بارش اور ہوا سے پھیلتے ہیں، لیف مانتر کے زخموں سے داخل ہوتے ہیں۔

ضرورت ہو تو دوا

دوا (اجزا)

کاپر آکسی کلورائیڈ

Copper oxychloride 50 WP

1 لیٹر میں 16 لیٹر ٹینکی
3 گرام 50 گرام

پہلے دیسی علاج
بیمار شاخیں کاٹ کر جلا دیں، قینچی صاف کریں۔ نئی کوپلوں کو لیف مانتر سے بچائیں (نیم کاٹیل)

کب: بارشوں سے پہلے اور نئی کوپلیں نکلنے پر؛ 15-20 دن بعد دوبارہ



گندم

گندم کی کنکی (زرد کنکی)

Wheat rust

بہچان: پتوں پر پھیلی یا بھوری دھاریاں، ہاتھ لگائیں تو زرد پاؤڈر لگ جائے۔
وجہ: پھپھوندی؛ ٹھنڈے نم موسم (فروری-مارچ) میں ہوا سے پھیلتی ہے۔

ضرورت ہو تو دوا

دوا (اجزا)

پروپیکنازول

Propiconazole 250 EC

1 لیٹر میں 16 لیٹر ٹینکی
1 ملی لیٹر 16 ملی لیٹر

پہلے دیسی علاج
کنکی سے بچاؤ والی منظور شدہ قسم کاشت کریں۔ وقت پر بوائی؛ بہت دیر سے بوائی نہ کریں

کب: پہلی دھاریاں نظر آتے ہی؛ ایکڑ کی مقدار بوتل کے لیبل سے



اخروٹ

اخروٹ کے کالے دھبے

Walnut blight & anthracnose

بہچان: پتوں اور سبز اخروٹ پر کالے دھبے؛ گرمی کالی ہو جائے اور پھل وقت سے پہلے گرے۔
وجہ: جراثیم اور پھپھوندی؛ بہار کی بارش میں نئے پتوں اور پھلوں پر حملہ۔

ضرورت ہو تو دوا

دوا (اجزا)


کاپر آکسی کلورائیڈ

Copper oxychloride 50 WP

1 لیٹر میں 16 لیٹر ٹینکی
3 گرام 50 گرام

پہلے دیسی علاج
گرے پتے اور کالے پھل جمع کر کے تلف کریں۔ سوکھی اور بیمار شاخیں سردیوں میں کاٹ دیں

کب: پتے نکلنے وقت، پھر بارشوں میں 10-15 دن بعد



نئے پودے، پھلدار درخت، گندم، گنا

دیمک

Termites

بہچان: پودا اچانک سوکھ جائے، تنے پر مٹی کی سرنگیں، جڑیں کھائی ہوئیں۔
وجہ: مٹی گوہر کی کھاد اور خشک زمین میں زیادہ۔

ضرورت ہو تو دوا

دوا (اجزا)

جڑوں میں منظور شدہ دیمک کش دوا

Approved termiticide, root drench

1 لیٹر میں 16 لیٹر ٹینکی
لیبل کے مطابق

پہلے دیسی علاج
ہمیشہ مٹی سڑی کھاد ڈالیں، کچا گوبر نہیں۔ نیم کی کھل: نئے پودے کے گڑھے میں 250 گرام، بڑے درخت کے گرد 1 کلو۔ آبپاشی باقاعدہ رکھیں

کب: پودا لگاتے وقت گڑھے میں، یا حملہ دیکھتے ہی



دلیسی طریقہ Natural way	فوری علاج (1 لیٹر پانی میں) Quick fix	کمی Shortage	پتے کی حالت What the leaf shows
گلی سڑی کھاد، مٹر اور دالوں کی فصل	یوریا یا 10 گرام فی لیٹر کا سپرے، یا زمین میں	نائٹروجن کی کمی Nitrogen (N)	پرانے (نیچے کے) پتے پورے پیلے
ہڈیوں کا چورا، گلی سڑی کھاد	ڈی اے پی زمین میں، بوائی کے وقت	فاسفورس کی کمی Phosphorus (P)	پتے گہرے سبز سے جامنی، بڑھوتری رکی ہوئی
لکڑی کی راکھ (تھوڑی مقدار)	ایس او پی 10 گرام فی لیٹر کا سپرے، یا زمین میں	پوٹاش کی کمی Potassium (K)	پتوں کے کنارے جلے ہوئے بھورے
کمپوسٹ ڈالیں، مٹی کا کھارا پن کم کریں	زنک یا آئرن (چیلینڈ) 1 گرام فی لیٹر؛ زمین میں زنک سلفیٹ 33%: 5 کلو فی ایکڑ	زنک یا آئرن کی کمی Zinc / Iron	نئے پتے پیلے مگر رگیں سبز، پتے چھوٹے
گلی سڑی کھاد	میکینیشیم سلفیٹ 5 گرام فی لیٹر کا سپرے	میکینیشیم کی کمی Magnesium (Mg)	پرانے پتوں میں رگوں کے درمیان پیلا پن
پانی باقاعدگی سے دیں، ملچ بچھائیں	کیلشیم نائٹریٹ 5 گرام فی لیٹر کا سپرے	کیلشیم کی کمی (بے قاعدہ پانی) Calcium (Ca)	ٹماٹر کا نچلا سر کالا اور گلا ہوا
زیادہ مقدار نقصان دہ ہے، ایک بار کافی	بوریکس 1 گرام فی لیٹر کا سپرے، پھول آنے سے پہلے	بوران کی کمی Boron (B)	پھول اور چھوٹا پھل گرے، پھل پھٹے، کوئیل سوکھے

🔑 پتوں پر خوراک کا سپرے صبح یا شام کریں، 10-15 دن بعد دوبارہ۔ یوریا اور کھاد کا سپرے ہمیشہ کم مقدار سے شروع کریں؛ زیادہ مقدار سے پتے جل جاتے ہیں۔ بہترین حل ہر موسم میں گلی سڑی کھاد ڈالنا اور ہر 2-3 سال بعد مٹی کا تجزیہ کروانا ہے۔

Not every yellow leaf is a disease ہر پیلا پتہ بیماری نہیں

کیا کریں What to do	نشانی Sign	وجہ Cause
پانی کم کریں، نکاس بنائیں	پتے پیلے اور ڈھیلے، مٹی ہر وقت گیلی، جڑیں گلنے لگیں	زیادہ پانی
صبح یا شام گہرا پانی، ملچ بچھائیں	دن کو پتے مرجھا کر نیچے لٹکیں، کنارے سوکھیں	پانی کی کمی
رات کو ڈھانپیں، کورے سے پہلے ہلکا پانی	پتے راتوں رات کالے یا جلے ہوئے، خاص طور پر اوپر کے	کور (سخت سردی)
کھاد تنے سے دور ڈالیں، اچھی طرح پانی دیں	پتوں کے کنارے جل جائیں، پودا یکدم مرجھائے	زیادہ کھاد
ہوا میں جڑی بوٹی مار دو انہ چھڑکیں، اسپرے مشین الگ رکھیں	پتے عجیب طرح سے مڑیں یا لمبے پتلے ہو جائیں	جڑی بوٹی مار دو انہ اثر

فصل Crop	کلی سڑی کھاد Compost (ton)	ڈی اے پی DAP (bags)	یوریا Urea (bags)	ایس او پی SOP (bags)	یوریا کب ڈالیں When to give urea
ٹماٹر، مرچ، بینگن Tomato, chilli, brinjal	10	2	2	1.5	تین برابر حصے: پھیری لگانے کے 20، 40 اور 60 دن بعد
آلو Potato	10	2	3	2	آدھا بوائی پر، آدھا مٹی چڑھاتے وقت
پیاز، لہسن Onion, garlic	8	1.5	2	1	تین حصے: 3، 6 اور 9 ہفتے بعد
گوبھی، بند گوبھی Cauliflower, cabbage	10	2	2.5	1	تین حصے: 3، 5 اور 7 ہفتے بعد
کدو، کھیرا، توری، کریلا Gourds, cucumber	8	1.5	1.5	1	دو حصے: بیل چلنے اور پھول آنے پر
پالک، دھنیا، ساگ Leafy greens	6	1	1.5	—	ہر کٹائی کے بعد تھوڑا تھوڑا
مٹر، لوبیا، مسور، چنے Peas & pulses	5	1	0.5	—	صرف بوائی پر: دالیں اپنی نائٹروجن خود بناتی ہیں
مکئی Maize	5	2	3	1	تین حصے: بوائی، گوڈی اور سیٹے نکلنے سے پہلے
گندم Wheat	—	1.5	2.5	1	آدھی پہلے پانی، آدھی دوسرے پانی کے ساتھ

کچن گارڈن اور چھوٹے کھیت کے لیے (فی مرلہ، یعنی 15×18 فٹ):

- کلی سڑی کھاد: 60 کلو (تقریباً 2 بوریاں)، بوائی سے 2 ہفتے پہلے مٹی میں ملائیں
- ڈی اے پی: 500 گرام بوائی کے وقت 10 ایس او پی: 300 گرام بوائی کے وقت
- یوریا: کل 500 گرام، 2-3 حصوں میں، پودوں سے 3-4 انچ دور ڈال کر پانی لگائیں

سنبھری اصول:

- ڈی اے پی اور ایس او پی بوائی کے وقت زمین میں: یوریا ہمیشہ حصوں میں اور نرم زمین میں
- یوریا پودے کے تنے کو نہ چھوئے؛ کھاد ڈالنے کے بعد ہلکا پانی ضرور دیں
- یہ عام انداز ہے: زرخیز زمین میں کم، کمزور زمین میں تھوڑا زیادہ۔ مٹی کا تجزیہ بہترین رہنما ہے
- گوبر کی کچی کھاد نہ ڈالیں؛ کم از کم 2-3 مہینے گلی ہوئی ہو ورنہ دیمک اور بیماریاں آتی ہیں

Fertilizer for fruit trees

Khud Kafeel Tehreek · Plant Care Chart

پھلدار درختوں کی کھاد

فی درخت، پورے سال کی مقدار



خود کفیل تحریک
SELF SUFFICIENT MOVEMENT

درخت کی عمر Tree age	گلی سڑی کھاد Compost	یوریا Urea	ڈی اے پی DAP	ایس او پی SOP
1-3 سال	10-20 کلو	100-250 گرام	100-200 گرام	100-200 گرام
4-6 سال	25-40 کلو	300-500 گرام	250-500 گرام	250-400 گرام
7-10 سال	40-50 کلو	500 گرام-1 کلو	500 گرام-1 کلو	500 گرام-1 کلو
10 سال سے زیادہ	50-60 کلو	1-1.5 کلو	1 کلو	1 کلو


کب ڈالیں؟
When

وقت Time	کیا ڈالیں What
دسمبر-جنوری	پوری گلی سڑی کھاد + پوری ڈی اے پی + پوری ایس او پی Winter, leaves fallen
فروری-مارچ	آدھی یوریا 2-3 weeks before flowers
اپریل-مئی	باقی آدھی یوریا After fruit set

بلند پہاڑی علاقوں میں ہر کام ایک مہینہ بعد کریں۔ لیٹوں، مالٹے اور کینو کو سال میں دو بار زنک کا سپرے (1 گرام فی لیٹر) بھی دیں۔

○ کھاد کیسے ڈالیں:

- تنے کے ساتھ نہیں؛ شاخوں کے پھیلاؤ کے نیچے ایک گول نالی (6-8 انچ گہری) بنائیں، کیونکہ خوراک لینے والی جڑیں وہیں ہوتی ہیں
- کھاد نالی میں ڈال کر مٹی سے ڈھانپیں اور فوراً پانی دیں
- نئے پودے کو کم مقدار، اور تنے سے 1 فٹ دور
- اگر درخت میں پھل بہت کم اور پتے بہت زیادہ ہوں تو یوریا کم کریں اور ایس او پی بڑھائیں



Neem leaf extract

نیم کے پتوں کا عرق

1 کلو تازہ پتے کوٹ کر 5 لیٹر پانی میں رات بھر بھگوئیں، صبح چھان لیں۔ 1 حصہ عرق + 4 حصے پانی۔
✓ رس چوسنے والے کیڑے، چھوٹی سنڈیاں

Soap water

صابن والا پانی

1 لیٹر پانی میں 5 ملی لیٹر صابن (ڈٹر جنٹ پاؤڈر نہیں)۔ پتوں کے نیچے کی طرف چھڑ لیں۔
✓ تیتلا، سفید مکھی

Baking soda spray

میٹھے سوڈے کا سپرے

1 لیٹر پانی + 5 گرام (ایک چائے کا چمچ) میٹھا سوڈا + 2 ملی لیٹر صابن۔
✓ سفوفی پھپھوندی

Trichoderma compost

ٹرائیکوڈرما والی کھاد

1 کلو ٹرائیکوڈرما پاؤڈر + 100 کلو گلی سڑی کھاد، ہلکا نم کر کے 7 دن سائے میں ڈھانپ کر رکھیں، پھر کھیت میں ملائیں۔ بیج پر 5 گرام فی کلو۔
✓ مرجھاؤ، جڑ کلن

Bordeaux mixture

بورڈو مکسچر 1%

100 گرام نیلا تھوٹھا 5 لیٹر پانی میں، 100 گرام چونا الگ 5 لیٹر پانی میں؛ نیلا گھول چونے والے میں ڈالیں۔ پلاسٹک کا برتن ماسی دن استعمال کریں۔
✓ پتہ مروڑ (آٹرو)، پتوں کے دھبے، لینکر

Neem oil spray

نیم کے تیل کا سپرے

1 لیٹر پانی + 5 ملی لیٹر نیم کا تیل + 1-2 ملی لیٹر برتن دھونے والا مائع صابن؛ اچھی طرح ہلا کر فوراً چھڑ لیں۔
✓ تیتلا، سفید مکھی، جوتیں، چھوٹی سنڈیاں، لیف مانتر

Garlic & chilli spray

لہسن اور ہری مرچ کا سپرے

100 گرام لہسن + 50 گرام ہری مرچ پیس کر 1 لیٹر پانی میں رات بھر رکھیں، چھان کر 10 لیٹر پانی اور 10 ملی لیٹر صابن ملائیں۔
✓ تیتلا، سنڈیاں، بھونڈیاں

Sour buttermilk spray

کھٹی لسی کا سپرے

3-4 دن پرانی کھٹی لسی 1 لیٹر + 10 لیٹر پانی۔ ہفتے میں ایک بار۔
✓ سفوفی پھپھوندی، پتوں کے دھبے

Yellow sticky cards

پیلے چپکنے والے کارڈ

پیلے کتے یا پلاسٹک پر گریس یا گاڑھا تیل لگائیں، پودوں سے ذرا اوپر لٹکائیں: 8-10 فی کنال۔
✓ سفید مکھی، تیتلا، پتے کی سرنگ والی مکھی

Wood ash

لکڑی کی راکھ

صبح شبنم میں پتوں پر ہلکی چھڑکیں؛ پودوں کے گرد مٹی میں تھوڑی ملائیں (پوناش)۔
✓ کدو کی لال بھونڈی، تیتلا

سپرے کرتے وقت حفاظت

Spray safety

1 دستانے، ماسک اور پوری آستین پہنیں؛ سپرے کے دوران کچھ نہ کھائیں پینیں، بعد میں ہاتھ منہ صابن سے دھوئیں۔

2 ہوا کے رخ کے ساتھ اور صبح یا شام سپرے کریں؛ تیز ہوا، بارش اور دوپہر کی دھوپ میں نہیں۔ پھول پر شہد کی مکھیاں ہوں تو شام کو۔

3 ایک وقت میں ایک ہی دوا؛ کئی دوائیں ملا کر اپنا "مکسچر" نہ بنائیں۔ ایک ہی دوا بار بار نہ چھڑکیں، بدل بدل کر استعمال کریں۔

4 دوا بچوں اور جانوروں سے دور، اصل ڈبے میں رکھیں؛ خالی ڈبے دوبارہ استعمال نہ کریں، زمین میں بادیں۔ پانی کے چشموں اور نڈیوں کے قریب دوا نہ دھوئیں۔

5 سپرے کے بعد سبزی 7 دن، پھل 14 دن نہ توڑیں (یا لیبل کے مطابق)، اور کھانے سے پہلے ہمیشہ دھو لیں۔



Ask an expert, free
khudkafeeltehreek.com

خود کفیل تحریک کی جانب سے آزاد جموں و کشمیر کے کسانوں کے لیے
Presented to the farmers of Azad Jammu & Kashmir by Khud Kafeel Tehreek

اپنا اگاؤ، اپنا کھاؤ

1.4

Sardar Liaquat Hussain

Founder & Chairman, Khud Kafeel Tehreek



خود کفیل تحریک
SELF SUFFICIENT MOVEMENT

یہ عام رہنمائی ہے۔ مقدار اور وقت فصل، موسم اور دوا کی طاقت کے لحاظ سے بدل سکتے ہیں؛ ہمیشہ لیبل پڑھیں اور شک ہو تو محکمہ زراعت یا ہمارے ماہرین سے پوچھیں۔

General guidance only; doses vary with crop, weather and product strength. Always follow the product label. Icons: Twemoji (CC-BY 4.0). Edition 2026.